

Amlodipine

دوائك: أملوديبين _____ ملغ

لماذا أتناول هذا الدواء؟ لديك ارتفاع في ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم خطير إذا لم يعالج. يمكن أن يسبب السكتات الدماغية والنوبات القلبية. يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى الموت إذا لم يتم علاجه. تناول قرصًا واحدًا أول شيء في كل صباح. لا تحتاج إلى تناول الطعام قبل تناول القرص.

ما الذي سأشعر به عندما أتناول هذا الدواء؟ في بعض الأحيان يكون هناك آثار جانبية من تناول الدواء. الآثار الجانبية هو شيء قد تشعر أنه غير طبيعي. تحدث بعض الآثار الجانبية من تناول أملوديبين بينما يعتاد جسمك على الدواء ويمكن أن تشمل الدوخة، شعور بالدوار، تورم القدمين/الكاحل.

هذه الآثار الجانبية ليست شائعة ولكن يمكن أن تحدث في كثير من الأحيان ويمكن أن تكون خطيرة للغاية. اتصل بالرقم 911 أو اذهب إلى غرفة الطوارئ فورًا إذا ظهرت عليك عوارض: الغثيان/قيء لا يتوقف، أو بول داكن، أو ألم بالمعدة/البطن؛ طفح جلدي، أو تورم في الوجه أو الشفاه أو اللسان أو الحلق، أو صعوبة في التنفس؛ ألم في الصدر أو أعراض نوبة قلبية بما في ذلك ألم الصدر/الفك/الذراع الأيسر، وضيق في التنفس، أو التعرق غير العادي.

ما الذي أحتاج معرفته أيضًا؟

1. يجب عليك تناول هذا الدواء كل يوم حتى لو كنت تشعر بتحسن.
2. يجب عليك إعادة ملء هذا الدواء كل شهر.
3. إذا قمت بزيارة عيادة طبيب آخر أو عيادة طبية أو غرفة الطوارئ، فيجب أن تخبرهم أنك تعاني من ارتفاع ضغط الدم وأنت تتناول أملوديبين.

هذا المحتوى هو لأغراض معرفية توضيحية فقط، وينبغي ألا يؤخذ على أنه مشورة طبية مهنية. اطلب دائمًا مشورة الطبيب أو أي مقدم رعاية صحية مؤهل آخر حول أي أسئلة قد تكون لديك بشأن حالة طبية أو علاج.