

SU MEDICAMENTO: Amlodipino _____mg

¿Por qué tomo este medicamento? Tiene hipertensión arterial. La hipertensión arterial es peligrosa si no es tratada. Puede provocar accidentes cerebrovasculares y ataques al corazón. Puede morir por tener hipertensión arterial si no es tratada.

Tome 1 comprimido a primera hora de la mañana. No es necesario comer antes de tomar el comprimido.

¿Qué sentiré cuando tome este medicamento? A veces los medicamentos tienen efectos secundarios. Un efecto secundario es algo que puede sentir que no es normal. Algunos de los efectos secundarios de tomar Amlodipino se producen a medida que su cuerpo se acostumbra al medicamento y pueden incluir mareos, aturdimiento, hinchazón de pies/tobillos.

Estos no son efectos secundarios comunes, pero pueden ocurrir muy a menudo y pueden ser muy graves. **Llame al 911 o acuda a la sala de emergencias de inmediato si presenta: náuseas/vómitos que no cesan, orina oscura o dolor estomacal/abdominal; urticaria, hinchazón de la cara, los labios, la lengua o la garganta o problemas para respirar; dolor en el pecho o síntomas de un ataque cardíaco, incluyendo dolor en el pecho/mandíbula/brazo izquierdo, dificultad para respirar o sudoración inusual.**

¿Qué más necesito saber?

1. Debe tomar este medicamento todos los días, aunque se sienta bien.
2. Debe reponer este medicamento cada mes.
3. Si acude a la consulta de otro médico, a una clínica médica o a la sala de urgencias, debe decirles que tiene hipertensión arterial y que está tomando Amlodipino.

Este contenido es sólo para fines informativos y no debe tomarse como un consejo médico profesional. Consulte siempre a su médico o a otro profesional sanitario cualificado si tiene alguna duda sobre alguna enfermedad o tratamiento