Furosemide

መድሃኒትዎ፡ ፉሮሴማይድ ____mg

<u>ይህንን መድሃኒት ለምን እወስዳለሁ?</u> ከፍተኛ የደም ግፊት አለብዎት ። ከፍተኛ የደም ግፊት ካልታከመ አደገኛ ነው ። የስትሮክ እና የልብ ድካም ያስከትላል ። ሕክምና ካልተደረገለት ከፍተኛ የደም ግፊት በሚያዝ ሊሞቱ ይችላሉ ።

<u>ይህንን መድሃኒት እንዴት እወስዳለሁ:</u> በየቀኑ 1 ወይም 2 ኪኒን ይውሰዱ።
1 ኪኒን የሚወስዱ ከሆነ **ጠዋት 1 ኪኒን ሁልግዜ ይውሰዱ።** ኪኒኑን ከመውሰዶ በፊት ምግብ መብላት የለቦትም።
2 ኪኒን የሚወስዱ ከሆነ **በየቀኑ ጠዋት 1 ኪኒን ሁልግዜ ይውሰዱ። ከ 6 ሰዓት በኋላ ሁለተኛውን ኪኒን ይውሰዱ።** ኪኒኑን ከመውሰዶ በፊት ምግብ መብላት የለቦትም።

<u>መድሃኒቱን በምወስድበት ግዜ ምን ይሰማኛል?</u>

አንዳንድ ጊዜ መድሃኒት መውሰድ የጎንዮሽ ጉዳቶች አሉ ። የጎንዮሽ ጉዳቱ በመደበኛነት ከሚሰማዎት ስሜት ውጪ የሆነ ነገር ነው። ፉሮሴማይድ ሰውነትዎ መድኃኒት መውሰድ ሲለምድ አንዳንድ የጎንዮሽ ጉዳቶች ይከሰታሉ፤ እነሱም ማዞር ፣ ራስ ምታት ፣ የእግር / የቁርጭምጭሚቶች እብጠት ይገኙበታል ።

እነዚህ የጎንዮሽ ጉዳቶች በተደጋጋሚ አይከሰቱም ነገር ግን በጣም ከባድ ናቸው ። **የፊት ፣ የከንፈር ፣ የምላስ ወይም የጉሮሮ እብጠት; የመተንፈስ ችግር; የመስማት ችሎታ መቀነስ; የሽንት መጠን መለወጥ; የሚርገበገብ ህመም; የእጆቹ ወይም የእግሮቹ መቅላት እና / ወይም እብጠት ከተሰማዎት ለ 911 ይደውሉ ወይም ወዲያውኑ ወደ ድንገተኛ ክፍል ይሂዱ።**

<u>ሌላ ምን ማወቅ አለብኝ?</u>

1. ጥሩ ስሜት ቢሰማዎትም በየቀኑ ይህንን መድሃኒት መውሰድ ይኖርብዎታል ።
2. ይህንን መድሃኒት በየወሩ ድጋሚ መሙላት አለብዎት ።
3. የሌላ ዶክተር ቢሮን ፣ የሕክምና ክሊኒክን ወይም ድንገተኛ ክፍልን ከጎበኙ ከፍተኛ የደም ግፊት እንዳለብዎ እና ፉሮሴማይድ እንደሚወስዱ መንገር አለብዎት ።

“ይህ የጤና መረጃ ይዘት ለመረጃነት ብቻ የሚያገለግል ሲሆን የባለሙያ የጤና ምክር ተደርጎ መወሰድ የለበትም፡፡ የሕክምና ሁኔታ ወይም ሕክምናን በተመለከተ ሊኖሩዎት በሚችሏቸው ማናቸውም ጥያቄዎች ሁል ጊዜ ከሐኪምዎ ወይም ከሌላ ብቁ የጤና እንክብካቤ አቅራቢ ምክር ይጠይቁ፡፡”