

Furosemide

دوائك: فوروسيميد _____ ملغ

لماذا أحصل على هذا الدواء؟ لديك ارتفاع في ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم خطير إذا لم يعالج. يمكن أن يسبب السكتات الدماغية والنوبات القلبية. يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى الموت إذا لم يتم علاجه.

كيف أتناول هذا الدواء: تناول قرص واحدة أو اثنين كل يوم.

إذا كنت تتناول قرصاً واحداً، تناول قرصاً واحداً أول شيء في كل صباح. لا تحتاج إلى تناول الطعام قبل تناول القرص. إذا كنت تتناول قرصين، أو أكثر. تناول قرصاً واحداً أول شيء في كل صباح. وتناول القرص الثاني بعد 6 ساعات. لا تحتاج إلى تناول الطعام قبل تناول القرص.

ما الذي سأشعر به عندما أتناول هذا الدواء؟

في بعض الأحيان يكون هناك آثار جانبية من تناول هذا الدواء. الآثار الجانبية هو شيء قد تشعر أنه غير طبيعي. تحدث بعض الآثار الجانبية من تناول فوروسيميد بينما يعتاد جسمك على الدواء ويمكن أن تشمل الدوخة، شعور بالدوار، صداع، تشنجات عضلية، غثيان.

بعض الآثار الجانبية لا تحدث في كثير من الأحيان ولكن يمكن أن تكون خطيرة للغاية. اتصل بالرقم 911 أو اذهب إلى غرفة الطوارئ فوراً إذا ظهرت عليك عوارض: طفح جلدي؛ تورم في الوجه أو الشفاه أو اللسان أو الحلق؛ صعوبة في التنفس؛ انخفاض في السمع؛ تغيير في كمية البول؛ وخز ألم؛ احمرار و/أو تورم الذراعين أو الساقين.

ما الذي أحتاج معرفته أيضاً؟

1. يجب عليك تناول هذا الدواء كل يوم حتى لو كنت تشعر بتحسن.
2. يجب عليك إعادة ملء هذا الدواء كل شهر.
3. إذا قمت بزيارة عيادة طبيب آخر أو عيادة طبية أو غرفة الطوارئ، فيجب أن تخبرهم أنك تعاني من ارتفاع ضغط الدم وأنت تتناول فوروسيميد.

هذا المحتوى هو لأغراض معرفية توضيحية فقط، وينبغي ألا يؤخذ على أنه مشورة طبية مهنية. اطلب دائماً مشورة الطبيب أو أي مقدم رعاية صحية مؤهل آخر حول أي أسئلة قد تكون لديك بشأن حالة طبية أو علاج.