

## SU MEDICAMENTO: Furosemida \_\_\_\_mg

**¿Por qué tomo este medicamento?** Tiene hipertensión arterial. La hipertensión arterial es peligrosa si no es tratada. Puede provocar accidentes cerebrovasculares y ataques al corazón. Puede morir por tener hipertensión arterial si no es tratada.

### **Tome 1 o 2 comprimidos al día.**

Si está tomando 1 comprimido, **tome 1 comprimido a primera hora de la mañana.** No tiene que comer antes de tomar el comprimido.

Si está tomando 2 comprimidos, hágalo. **Tome 1 comprimido a primera hora de la mañana. Tome el segundo comprimido 6 horas después.** No tiene que comer antes de tomar el comprimido.

### **¿Qué sentiré cuando tome este medicamento?**

A veces se producen efectos secundarios al tomar este medicamento. Un efecto secundario es algo que usted puede sentir que no es normal. Algunos de los efectos secundarios de tomar Furosemida ocurren a medida que su cuerpo se acostumbra al medicamento y pueden incluir mareos, aturdimiento, dolores de cabeza, calambres musculares y náuseas.

Algunos efectos secundarios no ocurren muy a menudo, pero pueden ser muy graves. **Llame al 911 o acuda a la sala de emergencias inmediatamente si desarrolla: urticaria; hinchazón de la cara, los labios, la lengua o la garganta; tiene dificultad para respirar; disminución de la audición; cambio en la cantidad de orina; dolor por hormigueo; enrojecimiento y/o hinchazón de los brazos o las piernas.**

### **¿Qué más necesito saber?**

1. Debe tomar este medicamento todos los días, aunque se sienta bien.
2. Debe reponer este medicamento cada mes.
3. Si acude a la consulta de otro médico, a una clínica médica o a la sala de urgencias, debe decirles que tiene hipertensión arterial y que está tomando Lisinopril.

Este contenido es sólo para fines informativos y no debe tomarse como un consejo médico profesional. Consulte siempre a su médico o a otro profesional sanitario cualificado si tiene alguna duda sobre alguna enfermedad o tratamiento