

Glipizide

دوائك: غليبيزيد/جليبيزايد _____ ملغ

لماذا أحصل على هذا الدواء؟ إذا كنت تعاني من مرض السكري أو معرض لخطر الإصابة بالسكري لأن لديك نسبة سكر مرتفعة في الدم. يمكن أن يسبب وجود نسبة كبيرة من السكر في الدم أمراض القلب أو السكتات الدماغية أو أمراض الكلى أو مشاكل في العينين أو الأعصاب.

كيف أتناول هذا الدواء: تناول قرصاً واحداً يومياً، قبل 30 دقيقة من وجبة الإفطار أو وجبتك الأولى من اليوم. حاول أن تتناول القرص في نفس الوقت تقريباً كل يوم.

ما الذي سأشعر به عندما أتناول هذا الدواء؟ في بعض الأحيان يكون هناك آثار جانبية من تناول الدواء. الآثار الجانبية هو شيء قد تشعر أنه غير طبيعي. تحدث بعض الآثار الجانبية لتناول غليبيزيد بينما يعتاد جسمك على الدواء بما في ذلك غثيان، وتقيؤ، وإسهال، واضطراب في المعدة.

بعض الآثار الجانبية لا تحدث في كثير من الأحيان ولكن يمكن أن تكون خطيرة للغاية. اتصل بالرقم 911 أو اذهب إلى غرفة الطوارئ فوراً إذا ظهرت عليك عوارض: طفح جلدي؛ تورم في الوجه أو الشفاه أو اللسان أو الحلق؛ صعوبة في التنفس؛ أو ضيق في التنفس، أو أثناء ممارسة التمارين الرياضية المكثفة، أو تعاني من تشنجات، أو ضعف أو الشعور بالإرهاق.

ما الذي أحتاج معرفته أيضاً؟

1. يجب عليك تناول هذا الدواء كل يوم حتى لو كنت تشعر بتحسن.
2. يجب عليك إعادة ملء هذا الدواء كل شهر.
3. اشرب الكثير من الماء.
4. تحتاج إلى رؤية الطبيب كل 3 أشهر لفحص نسبة السكر في الدم.
5. إذا قمت بزيارة عيادة طبيب آخر أو عيادة طبية أو غرفة الطوارئ، فيجب أن تخبرهم أنك تعاني من ارتفاع ضغط الدم وأنك تتناول غليبيزيد.