

SU MEDICAMENTO: Glipizida ____ mg

¿Por qué tomo este medicamento? Usted tiene diabetes o corre el riesgo de tenerla porque tiene demasiado azúcar en la sangre. Tener demasiado azúcar en la sangre puede causar enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, enfermedades del riñón o problemas con los ojos o los nervios.

Tome 1 comprimido al día, 30 minutos antes del desayuno o de la primera comida del día. Intente tomar el comprimido a la misma hora todos los días.

¿Qué sentiré cuando tome este medicamento? A veces los medicamentos tienen efectos secundarios. Un efecto secundario es algo que usted puede sentir que no es normal. Algunos de los efectos secundarios de tomar Glipizida ocurren cuando su cuerpo se acostumbra al medicamento, incluyendo náuseas, vómitos, diarrea y malestar estomacal.

Algunos efectos secundarios no son muy frecuentes, pero pueden ser muy graves. **Llame al 911 o vaya a la sala de emergencias inmediatamente si desarrolla: urticaria, hinchazón de la cara, los labios, la lengua o la garganta; tiene problemas para respirar o falta de aliento O durante el ejercicio intenso, experimenta calambres, debilidad o sensación de agotamiento.**

¿Qué más necesito saber?

1. Debe tomar este medicamento todos los días, aunque se sienta bien.
2. Debe reponer este medicamento cada mes.
3. Beba mucha agua.
4. Debe acudir a un médico cada 3 meses para que le analice el nivel de azúcar en sangre.
5. Si acude a la consulta de otro médico, a una clínica médica o a urgencias, debe decirles que tiene hipertensión arterial y que está tomando Glipizida.

Este contenido es sólo para fines informativos y no debe tomarse como un consejo médico profesional. Consulte siempre a su médico o a otro profesional sanitario cualificado si tiene alguna duda sobre alguna enfermedad o tratamiento