

## **SU MEDICAMENTO: Hidroclorotiazida (HCTZ) \_\_\_\_ mg**

**¿Por qué tomo este medicamento?** Tiene hipertensión arterial. La hipertensión arterial es peligrosa si no es tratada. Puede provocar accidentes cerebrovasculares y ataques al corazón. Puede morir por tener hipertensión arterial si no es tratada.

**Tome 1 comprimido a primera hora de la mañana.** No es necesario comer antes de tomar el comprimido.

**¿Qué sentiré cuando tome este medicamento?** A veces se producen efectos secundarios al tomar este medicamento. Un efecto secundario es algo que usted puede sentir que no es normal. Algunos efectos secundarios de tomar HCTZ ocurren a medida que su cuerpo se acostumbra al medicamento y pueden incluir diarrea, mareos, pérdida de apetito, malestar estomacal y dolores de cabeza.

Algunos efectos secundarios no son muy frecuentes, pero pueden ser muy graves.

**Llame al 911 o vaya a la sala de emergencias inmediatamente si desarrolla: urticaria; hinchazón de la cara, los labios, la lengua o la garganta; tiene problemas para respirar o falta de aliento; dolor de ojos/disminución de la visión; o, poca o ninguna orina.**

### **¿Qué más necesito saber?**

1. Debe tomar este medicamento todos los días, aunque se sienta bien.
2. Debe reponer este medicamento cada mes.
3. No beba alcohol. Beba mucha agua.
4. Si acude a la consulta de otro médico, a una clínica médica o a urgencias, debe decirles que tiene hipertensión arterial y que está tomando Lisinopril.
5. Si se queda embarazada, deje de tomar este medicamento inmediatamente. Vuelva a Grace Village Medical Clinic para reunirse con un médico para que podamos encontrar otro medicamento para la hipertensión que pueda tomar.

Este contenido es sólo para fines informativos y no debe tomarse como un consejo médico profesional. Consulte siempre a su médico o a otro profesional sanitario cualificado si tiene alguna duda sobre alguna enfermedad o tratamiento