

## Lisinopril

دوائك: ليزينوبريل \_\_\_\_\_ ملغ

لماذا أحصل على هذا الدواء؟ لديك ارتفاع في ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم خطير إذا لم يعالج. يمكن أن يسبب السكتات

الدماغية والنوبات القلبية. يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى الموت إذا لم يتم علاجه.

تناول قرصًا واحدًا أول شيء في كل صباح. لا تحتاج إلى تناول الطعام قبل تناول القرص.

ما الذي سأشعر به عندما أتناول هذا الدواء: في بعض الأحيان يكون هناك آثار جانبية من تناول هذا الدواء. الآثار الجانبية هو شيء قد تشعر أنه غير طبيعي. تحدث بعض الآثار الجانبية بينما يعتاد جسمك على الدواء ويمكن أن تشمل سعال، دوخة، صداع، غثيان، وإسهال.

بعض الآثار الجانبية لا تحدث في كثير من الأحيان ولكن يمكن أن تكون خطيرة للغاية. اتصل بالرقم 911 أو اذهب إلى غرفة الطوارئ فورًا إذا ظهرت عليك عوارض: طفح جلدي؛ تورم في الوجه أو الشفاه أو اللسان أو الحلق؛ صعوبة في التنفس؛ غثيان/قيء لا يخف عن علاجاتنا. هذا الدواء كافي بل يطبخ في بولي كلكتن تشعر بتحسن.

ما الذي أحتاجه بعد تناول هذا الدواء كل شهر.

3. لا تشرب الكحول. اشرب الكثير من الماء.

4. إذا قمت بزيارة عيادة طبيب آخر أو عيادة طبية أو غرفة الطوارئ، فيجب أن تخبرهم أنك تعاني من ارتفاع

ضغط الدم وأنت تتناول ليزينوبريل.

5. إذا أصبحت حاملاً، فتوقفي عن تناول هذا الدواء على الفور. راجع عيادة غريس فيليديج الطبية للقاء طبيب حتى

تتمكن من العثور على دواء آخر لارتفاع ضغط الدم يمكنك تناوله.

هذا المحتوى هو لأغراض معرفية توضيحية فقط، وينبغي ألا يؤخذ على أنه مشورة طبية مهنية. اطلب دائماً مشورة الطبيب أو أي مقدم رعاية صحية مؤهل آخر حول أي أسئلة قد تكون لديك بشأن حالة طبية أو علاج.