

SU MEDICAMENTO: Lisinopril ____ mg

¿Por qué tomo este medicamento? Tiene hipertensión arterial. La hipertensión arterial es peligrosa si no es tratada. Puede provocar accidentes cerebrovasculares y ataques al corazón. Puede morir por tener hipertensión arterial si no es tratada.

Tome 1 comprimido a primera hora de la mañana. No es necesario comer antes de tomar el comprimido.

¿Qué sentiré cuando tome este medicamento? A veces se producen efectos secundarios al tomar este medicamento. Un efecto secundario es algo que puede sentir que no es normal. Algunos efectos secundarios se producen a medida que su cuerpo se acostumbra al medicamento y pueden incluir tos, mareos, dolor de cabeza, náuseas y diarrea.

Algunos efectos secundarios no son muy frecuentes, pero pueden ser muy graves.

Llame al 911 o vaya a la sala de emergencias inmediatamente si tiene: urticaria; hinchazón de la cara, los labios, la lengua o la garganta; tiene problemas para respirar, náuseas/vómitos que no cesan; dolor estomacal o abdominal intenso; orina oscura.

¿Qué más necesito saber?

1. Debe tomar este medicamento todos los días, aunque se sienta bien.
2. Debe reponer este medicamento cada mes.
3. No beba alcohol. Beba mucha agua.
4. Si acude a la consulta de otro médico, a una clínica médica o a urgencias, debe decirles que tiene hipertensión arterial y que está tomando Lisinopril.
5. Si se queda embarazada, deje de tomar este medicamento inmediatamente. Vuelva a Grace Village Medical Clinic para reunirse con un médico para que podamos encontrar otro medicamento para la hipertensión arterial que pueda tomar.

Este contenido es sólo para fines informativos y no debe tomarse como un consejo médico profesional. Consulte siempre a su médico o a otro profesional sanitario cualificado si tiene alguna duda sobre alguna enfermedad o tratamiento