

Metformin

دوائك: ميتفورمين _____ ملغ

لماذا أخذ هذا الدواء؟ إذا كنت تعاني من مرض السكري أو معرض لخطر الإصابة بالسكري لأن لديك نسبة سكر مرتفعة في الدم. يمكن أن يسبب وجود نسبة كبيرة من السكر في الدم أمراض القلب أو السكتات الدماغية أو أمراض الكلى أو مشاكل في العينين أو الأعصاب.

تناول قرصاً واحداً مع وجبة يومياً.

تناول قرصاً واحداً بعد تناول وجبة الإفطار وقرصاً واحداً بعد تناول العشاء كل يوم.

تناول قرصاً واحداً بعد تناول وجبة الإفطار، وقرصاً واحداً بعد تناول الغداء، وقرصاً واحداً بعد تناول العشاء كل يوم.

ما الذي سأشعر به عندما أتناول هذا الدواء؟ في بعض الأحيان يكون هناك آثار جانبية من تناول الدواء. الآثار الجانبية هو شيء قد تشعر أنه غير طبيعي. تحدث بعض الآثار الجانبية من تناول ميتفورمين بينما يعتاد جسمك على الدواء ويمكن أن تشمل غثيان، إسهال، اضطراب في المعدة، وغازات.

بعض الآثار الجانبية لا تحدث في كثير من الأحيان ولكن يمكن أن تكون خطيرة للغاية. اتصل بالرقم 911 أو اذهب إلى غرفة الطوارئ فوراً إذا ظهرت عليك عوارض: طفح جلدي؛ تورم في الوجه أو الشفاه أو اللسان أو الحلق؛ صعوبة في التنفس؛ أو صعوبة في التنفس، أو أثناء ممارسة التمارين الرياضية المكثفة، أو تعاني من تشنجات، أو ضعف أو الشعور بالإرهاق.

ما الذي أحتاج معرفته أيضاً؟

1. يجب عليك تناول هذا الدواء كل يوم حتى لو كنت تشعر بتحسن.
2. يجب عليك إعادة ملء هذا الدواء كل شهر.
3. اشرب الكثير من الماء ولا تفوت أي من وجبات الطعام.
4. تحتاج إلى رؤية الطبيب كل 3 أشهر لفحص نسبة السكر في الدم.
5. إذا قمت بزيارة عيادة طبيب آخر أو عيادة طبية أو غرفة الطوارئ، فيجب أن تخبرهم أنك تعاني من ارتفاع ضغط الدم وأنك تتناول ميتفورمين.

هذا المحتوى هو لأغراض معرفية توضيحية فقط، وينبغي ألا يؤخذ على أنه مشورة طبية مهنية. اطلب دائماً مشورة الطبيب أو أي مقدم رعاية صحية مؤهل آخر حول أي أسئلة قد تكون لديك بشأن حالة طبية أو علاج.