

Metoprolol

دوائك: ميتوبرولول ___ ملغ

لماذا أخذ هذا الدواء؟ لديك ارتفاع في ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم خطير إذا لم يعالج. يمكن أن يسبب السكتات الدماغية والنوبات القلبية. يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى الموت إذا لم يتم علاجه.

تناول قرصاً واحداً كل يوم عندما تتناول وجبة الطعام.

ما الذي سأشعر به عندما أتناول هذا الدواء؟ في بعض الأحيان يكون هناك آثار جانبية من تناول الدواء. الآثار الجانبية هو شيء قد تشعر أنه غير طبيعي. تحدث بعض الآثار الجانبية من تناول ميتوبرولول بينما يعتاد جسمك على الدواء ويمكن أن تشمل دوخة، إسهال، إرهاق، حكة خفيفة أو طفح جلدي.

بعض الآثار الجانبية لا تحدث في كثير من الأحيان ولكن يمكن أن تكون خطيرة للغاية. اتصل بالرقم 911 أو اذهب إلى غرفة الطوارئ فوراً إذا ظهرت عليك عوارض: طفح جلدي؛ تورم في الوجه أو الشفاه أو اللسان أو الحلق؛ أو صعوبة في التنفس.

ما الذي أحتاج معرفته أيضاً؟

1. يجب عليك تناول هذا الدواء كل يوم حتى لو كنت تشعر بتحسن.
2. يجب عليك إعادة ملء هذا الدواء كل شهر.
3. إذا قمت بزيارة عيادة طبيب آخر أو عيادة طبية أو غرفة الطوارئ، فيجب أن تخبرهم أنك تعاني من ارتفاع ضغط الدم وأنت تتناول ميتوبرولول.
4. إذا تم تشخيصك بمشكلة خطيرة في القلب أو مشاكل حادة في الدورة الدموية أو فشل القلب أو لديك تاريخ من بطء ضربات القلب التي تسببت في إغماءك، فلا يمكنك تناول هذا الدواء. وأخبر طبيبك على الفور.
5. إذا كنت تعاني من حساسية من أي دواء يؤثر على القلب وتدفق الدم، فلا يمكنك تناول هذا الدواء. قد يكون لهذا الدواء اسم آخر وهو أتينولول. وأخبر طبيبك على الفور.

هذا المحتوى هو لأغراض معرفية توضيحية فقط، وينبغي ألا يؤخذ على أنه مشورة طبية مهنية. اطلب دائماً مشورة الطبيب أو أي مقدم رعاية صحية مؤهل آخر حول أي أسئلة قد تكون لديك بشأن حالة طبية أو علاج.