

Simvastatin

دوائك: سيمفاستاتين _____ ملغ

لماذا أحصل على هذا الدواء؟ لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول. ارتفاع الكوليسترول خطير إذا لم يعالج. يمكن أن يسبب السكتات الدماغية والنوبات القلبية. يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى الموت إذا لم يتم علاجه.

تعليمات تناول هذا الدواء: تناول قرص واحد في وقت النوم يومياً. لا تحتاج إلى تناول الطعام قبل تناول القرص.

ما الذي سأشعر به عندما أتناول هذا الدواء؟ في بعض الأحيان يكون هناك آثار جانبية من تناول هذا الدواء. الآثار الجانبية هو شيء قد تشعر أنه غير طبيعي. تحدث بعض الآثار الجانبية من تناول سيمفاستاتين بينما يعتاد جسمك على الدواء بما في ذلك الصداع، أو الغثيان، أو آلام المعدة، أو الإمساك، أو أعراض البرد مثل انسداد الأنف أو التهاب الحلق.

إذا كنت تعاني ألماً عضلياً غير مفسر أو إيلام عند اللمس، أو ضعفاً مرافق لحمى، أو تشعر بتعب شديد ولديك بول داكن اللون، فحدد موعداً لرؤية الطبيب على الفور.

بعض الآثار الجانبية لا تحدث في كثير من الأحيان ولكن يمكن أن تكون خطيرة للغاية. اتصل بالرقم 911 أو اذهب إلى غرفة الطوارئ فوراً إذا ظهرت عليك عوارض: طفح جلدي؛ تورم في الوجه أو الشفاه أو اللسان أو الحلق؛ صعوبة في التنفس؛ أو صعوبة في التنفس.

ما الذي أحتاج معرفته أيضاً؟

1. يجب عليك تناول هذا الدواء كل يوم حتى لو كنت تشعر بتحسن.
2. يجب عليك إعادة ملء هذا الدواء كل شهر.
3. اشرب الكثير من الماء.
4. لا تشرب الكحول.
5. لا تأكل الجريب فروت/الليمون الهندي، ولا تشرب عصير الجريب فروت أو تستخدم أي منتج آخر من الجريب فروت.
6. لا تستخدم هذا الدواء إذا كنت تعاني من مرض في الكبد.
7. إذا أصبحت حاملاً، فتوقفي عن تناول هذا الدواء على الفور. راجع عيادة غريس فيليدج الطبية للقاء طبيب حتى تتمكن من العثور على دواء آخر يمكنك تناوله.
8. لا تستطيع الأمهات الجدد إرضاع أطفالهن أثناء استخدام هذا الدواء.
9. إذا قمت بزيارة عيادة طبيب آخر أو عيادة طبية أو غرفة الطوارئ، فيجب أن تخبرهم أنك تعاني من ارتفاع الكوليسترول وأنت تتناول دواء سيمفاستاتين.