

VOTRE MÉDICAMENT : Simvastatine ____mg

Pourquoi prendre ce médicament ? Vous avez un taux de cholestérol élevé. L'hypercholestérolémie est dangereuse si elle n'est pas traitée. Il peut causer des accidents vasculaires cérébraux et des crises cardiaques. Vous pouvez mourir d'un taux de cholestérol élevé qui n'est pas traité.

Instructions pour prendre ce médicament : Prenez 1 comprimé à l'heure du coucher tous les jours. Vous n'avez pas besoin de manger avant de prendre le comprimé.

Que vais-je ressentir lorsque je prends ce médicament ? La prise de ce médicament peut parfois entraîner des effets secondaires. Un effet secondaire est quelque chose que vous pouvez ressentir et qui n'est pas normal. Certains effets secondaires de la Simvastatine surviennent lorsque votre corps s'habitue au médicament, notamment des maux de tête, des nausées, des douleurs à l'estomac, de la constipation ou des symptômes de rhume comme un nez bouché ou un mal de gorge.

Si vous présentez une douleur ou une sensibilité musculaire inexplicée ou une faiblesse accompagnée de fièvre, si vous êtes très fatigué et si vos urines sont de couleur foncée, prenez immédiatement rendez-vous avec un médecin.

Certains effets secondaires ne se produisent pas très souvent mais peuvent être très graves. **Appelez le 911 ou rendez-vous immédiatement aux urgences si vous présentez : de l'urticaire, un gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, des difficultés à respirer ou un essoufflement.**

Que dois-je savoir d'autre ?

1. Vous devez prendre ce médicament tous les jours, même si vous vous sentez bien.
2. Vous devez renouveler ce médicament tous les mois.
3. Buvez beaucoup d'eau.
4. Ne buvez pas d'alcool.
5. Ne mangez pas de pamplemousse, ne buvez pas de jus de pamplemousse et n'utilisez pas d'autres produits à base de pamplemousse.
6. N'utilisez pas ce médicament si vous souffrez d'une maladie du foie.
7. **Si vous tombez enceinte**, arrêtez immédiatement de prendre ce médicament. Retournez à la clinique médicale Grace Village pour rencontrer un médecin afin que nous puissions vous trouver un autre médicament à prendre.
8. Les nouvelles mères **ne peuvent pas allaiter leur bébé pendant qu'elles utilisent ce médicament.**
9. Si vous vous rendez dans un autre cabinet médical, une autre clinique médicale ou aux urgences, vous devez leur dire que vous avez un taux de cholestérol élevé et que vous prenez de la Simvastatine.

Ce contenu est fourni à titre d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme un avis médical professionnel. Pour toute question relative à un problème de santé ou à un traitement, demandez toujours l'avis de votre médecin ou d'un autre professionnel de la santé qualifié.